

THECHVIR ^{Líquido}

Recomendamos o uso do Thechvir PURO (sem diluição) para a área profissional de tatuagem. O tempo de ação efetiva para os microorganismos testados é de até 10 minutos (tempo da secagem completa).

• **Superfícies e objetos** (Carrinho de apoio, gavetas, maca, cadeira, embalagens de produtos, fonte, clip-cord, embalagem de tinta, tesoura, máquina de tatuagem, máquina de decalque, impressora, bancada, etc): Aplicar o Thechvir puro em um pano (deve ficar bem úmido), e passar por toda a superfície dos objetos. Umedecer novamente o pano sempre que secar. Não enxugar. Aguardar completa secagem antes de reutilizar.

THECHVIR ^{Wipes}

Cada lenço limpa e desinfeta até 1m² de superfície. O tempo de ação efetiva para os microorganismos testados é de até 10 minutos (tempo da secagem completa).

• **Superfícies e objetos** (Carrinho de apoio, gavetas, maca, cadeira, embalagens de produtos, fonte, clip-cord, embalagem de tinta, tesoura, máquina de tatuagem, máquina de decalque, impressora, bancada, etc): Dobrar um lenço ao meio, e passar sobre a superfície a ser desinfetada. Ir dobrando até utilizar todos os lados limpos, enquanto estiver úmido. Não enxugar. Aguardar completa secagem antes de reutilizar.

MICROORGANISMOS TESTADOS E TEMPO DE AÇÃO (LÍQUIDO OU LENÇO):

- Trichophyton mentagrophytes **30 seg.**
- Staphylococcus aureus (Pneumonia, Meningite, Endocardite) **30 seg.**
- Salmonella choleraesuis (Febre tifóide, Salmonelose) **30 seg.**
- Escherichia coli (Infecções do trato urinário) **30 seg.**
- Sars-Cov (Covid-19) **1 min.**
- KPC Klebsiella pneumoniae carbapenemase **1 min.**
- Pseudomona aeruginosa **1 min.**
- Vírus HIV **5 min.**
- Vírus Hepatite B **5 min.**
- Mycobacterium bovis (BCG) (Tuberculose) **10 min.**
- Cândida albicans (Candidíase) **10 min.**
- Bacillus subtilis **10 min.**
- Clostridium sporogenes. **10 min.**
- Mycobacterium avium (Fibrose cística, Fibrose pulmonar) **10 min.**
- Mycobacterium terrae **10 min.**
- Mycobacterium massiliense **10 min.**
- Mycobacterium smegmatis (Lepra, Tuberculose) **10 min.**

IMPORTANTE!

- O peróxido de Hidrogênio pode reagir com a queratina da camada superficial da pele da mão, podendo causar ressecamento e leve esbranquiçamento (que desaparecerá em poucas horas), por isso recomendamos o manuseio da linha Thechvir com luvas de procedimento como as de vinil ou nitrílicas.
- Não armazenar o Thechvir Líquido diluído por mais de 15 dias.
- A embalagem de Thechvir líquido possui um pequeno furo na tampa para escape da pressão de gases que podem se formar com o tempo de armazenamento. Durante o transporte podem haver pequenos escapes de líquido. **ARMAZENAR A EMBALAGEM DO THECHVIR LÍQUIDO NA VERTICAL** para evitar vazamentos.